

AGOMELATIN

Rekommendationer för att undvika leverbiverkningar

Agomelatin kan orsaka biverkningar som kan innebära förändringar i din leverfunktion.

Denna handbok innehåller rekommendationer för att undvika leverbiverkningar samt råd om vad man ska göra om sådana biverkningar uppstår under behandling med Agomelatin.

Rådfråga din läkare för ytterligare information.

Agomelatin är ett antidepressivt läkemedel som kan hjälpa till att behandla depression.

För att få ut det mesta av din behandling ska du följa läkarens rekommendationer gällande användning av Agomelatin (dos, behandlingstid, tillhörande uppföljning såsom överenskomna läkarbesök, blodprover).

INNAN DU BÖRJAR TA AGOMELATIN

- **Tala om för din läkare om du vet att din lever inte fungerar ordentligt. I så fall ska du inte ta Agomelatin.**
- **Det kan även finnas andra orsaker till att Agomelatin inte är lämpligt för dig.**
Fråga din läkare om råd:
 - om du någon gång har haft leverproblem
 - om du har fetma eller är överviktig
 - om du har diabetes
 - om du använder alkohol
 - om du tar andra läkemedel (man vet att vissa läkemedel påverkar levern).

VAD MAN SKA GÖRA FÖR ATT UNDVIKA LEVERPROBLEM UNDER BEHANDLINGEN

➤ Ta regelbundna blodprover

- **Varför?**

Din läkare ska ha kontrollerat att din lever fungerar ordentligt **före behandlingen påbörjas**. Blodproverna som din läkare ordinerat ger honom/henne information om **hur din lever fungerar** för att avgöra om Agomelatin är lämpligt för dig.

Vissa patienter kan få förhöjda nivåer av leverenzymmer i deras blod vid behandling med Agomelatin. Nivåerna av dessa leverenzymmer talar om huruvida din lever fungerar ordentligt och är nödvändiga för att läkaren ska kunna följa upp din behandling.

- **När?**

| | Före behandlingen påbörjas eller vid dosökning | Efter cirka 3 veckor | Efter cirka 6 veckor | Efter cirka 3 månader | Efter cirka 6 månader |
|------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Blodprover | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Om din läkare ökar dosen till 50 mg ska proverna utföras på nytt.

Kom ihåg att ta med dig sidan med **PÅMINNELSE OM TIDSBOKNING FÖR BLODPROVER** (se nästa sida) till din läkare

Informera omedelbart läkare om du får reda på att leverenzymnivån i ditt blod ökar under behandlingen.

➤ **Var uppmärksam på tecken på leverproblem**

Om du observerar något av följande kan det betyda att din lever inte fungerar ordentligt:

- gul hud/gula ögon
- mörk urin
- ljus avföring
- smärta i den övre, högra delen av buken
- onormal trötthet (speciellt i samband med andra symtom som anges ovan)

⇒ Rådfråga omedelbart läkare som kan uppmana dig att sluta ta Agomelatin.

PÅMINNELSE OM TIDSBOKNING FÖR BLODPROVER

KOM IHÅG

Det är viktigt att du lämnar regelbundna blodprover medan du tar Agomelatin.

TABELLEN NEDAN HJÄLPER DIG ATT KOMMA IHÅG NÄR DU SKA LÄMNA BLODPROVER.

| AGOMELATIN 25 mg – DATUM FÖR FÖRSTA INTAG: | |
|---|--------------|
| Blodprov för mätning av leverenzymnivån | Datum |
| Datum för det första blodprovet (<i>då behandlingen påbörjas</i>) | |
| Datum för det andra blodprovet (<i>efter cirka 3 veckor</i>) | |
| Datum för det tredje blodprovet (<i>efter cirka 6 veckor</i>) | |
| Datum för det fjärde blodprovet (<i>efter cirka 3 månader</i>) | |
| Datum för det femte blodprovet (<i>efter cirka 6 månader</i>) | |

Din läkare kan besluta att du behöver lämna ytterligare blodprover.

| DOSÖKNING TILL 50 mg - DATUM FÖR FÖRSTA INTAG: | |
|--|--------------|
| Blodprov för mätning av leverenzymnivån | Datum |
| Datum för blodprovet som tas då Agomelatin 50 mg påbörjas | |
| Datum för det andra blodprovet (<i>efter cirka 3 veckor</i>) | |
| Datum för det tredje blodprovet (<i>efter cirka 6 veckor</i>) | |
| Datum för det fjärde blodprovet (<i>efter cirka 3 månader</i>) | |
| Datum för det femte blodprovet (<i>efter cirka 6 månader</i>) | |

Din läkare kan besluta att du behöver lämna ytterligare blodprover.

Kom ihåg att ta med dig denna handbok när du besöker din läkare.

För mer detaljerad information, se bipacksedeln i förpackningen för Agomelatin.